

Tre divisioni, un'unità di intenti. Produrre qualità.
Three Departments, a unique will: Produce Quality.

LIDOCAINA E CLOREXIDINA GEL

Formulazione

Lidocaina HCl	2 g
Clorexidina digluconato sol. 20%	0,25-1 g
Idrossietilcellulosa	3 g
Acqua altamente depurata	q.b. a 100 g

Preparazione

Portare l'acqua all'ebollizione per 20min., raffreddare e sciogliervi la lidocaina e la clorexidina; disperdere a pioggia l'idrossietilcellulosa mescolando lentamente; lasciare riposare per qualche ora fino a gelificazione.

Indicazioni terapeutiche

Antisettico ed anestetico locale.

Regime di dispensazione

Ricetta non ripetibile.

Note

Data limite utilizzo: 3-6 mesi.

Le informazioni contenute nel seguente mezzo informativo sono, allo stato attuale delle nostre conoscenze, accurate, corrette e derivate dalla letteratura scientifica più accreditata. Tuttavia sono divulgate senza alcuna garanzia riguardo a possibili errori contenuti nella letteratura di provenienza. In particolare non si assumono responsabilità per ciò che attiene ad eventuali applicazioni e/o usi impropri.

FARMALABOR Srl

Head office Via Pozzillo, zona ind. - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Legal head office Via Oberdan, 52 - 76012 Canosa di Puglia (Bt) - Italy

Representative office Via Palermo, 23 - 20090 Assago (MI) - Italy

Cod. Fisc. e Partita Iva - VAT n° 05676410722

Phone +39 0883 611 301
Fax +39 0883 664 824
Fax 800 085 708
E-mail info@farmalabor.it
Web www.farmalabor.it

La qualità aziendale è riconosciuta dalle certificazioni Company quality is guaranteed through following certifications
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

